

COVID-19 - PROCEDURE VOOR THUISVERPLEEGKUNDIGEN

Versie 13 maart 2020

Met de samenwerking van het Nederlandstalig Platform Thuisverpleging (NPTV)

Tijdens de SARS-epidemie in 2002 heeft nosocomiale transmissie in belangrijke mate bijgedragen aan de verspreiding van het virus. Hiervoor dient ook nu extra aandacht geschonken te worden aan het nauwkeurig naleven van algemene hygiënemaatregelen. Patiënten met een risicofactor¹ vormen een kwetsbare populatie. Gezondheidswerkers moeten oplettend zijn voor mogelijke Covid-19 patiënten en extra voorzorgsmaatregelen nemen.

1. Gevalsdefinitie

1.1. MOGELIJK GEVAL

Een mogelijk geval van COVID-19 is elke persoon met een acute infectie van de bovenste of onderste luchtwegen

- die nieuw verschijnen

of

- die verergeren, voor een patiënt die chronische respiratoire symptomen vertoont.

1.2. BEVESTIGD GEVAL

Een bevestigd geval wordt gedefinieerd als een persoon die een laboratorium bevestigde diagnose van COVID-19 heeft.

2. Algemene richtlijnen

2.1. ALGEMENE HYGIËNE

De verpleegkundige moet in het bijzonder letten op de algemene hygiënische maatregelen in het contact met alle patiënten; meer specifiek:

- Regelmatig de handen wassen en ontsmetten
 - Voor- en na zorgcontact met een patiënt
 - Vóór een zuivere of invasieve behandeling
 - Na contact met de directe omgeving van de patiënt
 - Na het uittrekken van handschoenen.

¹ Risicogroepen: patiënten met

- Leeftijd ouder dan 65 jaar
- Cardiovasculaire aandoeningen, diabetes, AHT (arteriële hypertensie)
- Ernstige chronische hart-, long- of nieraandoeningen
- Immunosuppressie, maligne hemopathie, actieve neoplasie

- Wissel handschoenen na elke verzorging van de patiënt en pas daarna handhygiëne toe volgens indicatie.
- Leef hoest- en niesetiquette na en leer dit ook aan je patiënt
https://d34j62pglfm3rr.cloudfront.net/downloads/20200217_coronavirus_poster_general_NL.pdf
- De verpleegkundige moet aandachtig zijn voor symptomen van een acute infectie van de onderste of bovenste luchtwegen bij patiënten. Indien dit het geval is dient de behandelende arts gecontacteerd te worden voor het gepast beleid.
- Vraag patiënten om aan te geven indien ze symptomen van COVID-19 vertonen.

2.2. ORGANISATIE VAN HET WERK

- Ter voorbereiding van een mogelijke periode van (thuis)isolatie van de verpleegkundige is het aan te bevelen vervanging te voorzien om de continuïteit van de gezondheidszorg te waarborgen.
 - door een collega,
 - door de patiënt te informeren over andere thuiszorgbedrijven,
 - door te bespreken welke medische centra of huisartsen bepaalde procedures zouden kunnen overnemen,
 - door de mogelijkheid te overleggen met de familie van de patiënt om tijdelijk een deel van de zorg over te nemen.
- Informatie voor zelfstandige thuisverpleegkundige in verband met de economische impact in geval van isolatie omwille van COVID-19 vind je hier: <https://www.inasti.be/nl/news/moeilijkheden-door-het-coronavirus>

3. Wat bij zorg aan een mogelijk of bevestigd geval van COVID-19?

- Mogelijke en bevestigde gevallen van COVID-19 worden op dezelfde manier behandeld door de verpleegkundige.
- De verpleegkundige moet beoordelen of de zorg noodzakelijk is of kan worden uitgesteld. Specifieke situaties kunnen met de huisarts besproken worden. De verpleegkundige verduidelijkt de hygiënische maatregelen voor de patiënt: "[Hygiënevoorlichting aan de patiënt](#)"
- Indien de zorg noodzakelijk is, plan deze dan aan het eind van de dag in en pas de volgende maatregelen toe.
 - Geef de patiënt een chirurgisch mondmasker (het virus wordt overgedragen via druppels tot +/- 1,5 m). Als er geen masker beschikbaar is, kan de verpleegkundige de patiënt vragen om zijn of haar neus en mond te bedekken met een sjaal of doek tijdens de verzorging. Deze moet na elke behandeling worden gewassen.
 - Draag zelf een chirurgisch mondmasker² en handschoenen tijdens de verzorging van de patiënt.
 - Was uw handen na de behandeling met zeep of gebruik een hydro-alcoholische oplossing.

² Mag in epidemische omstandigheden gedurende 8 u gedragen worden ongeacht de opeenvolging van interventies, zonder naar buiten te gaan, onder bepaalde voorwaarden (cfr advies Hoge Gezondheidsraad 2020).

o mag met dat doel bijgehouden worden (rond de hals) maar nooit in de zak;

o mag voorlopig bewaard worden op een plaats zonder besmettingsgevaar (bijvoorbeeld in een geïndividualiseerde papieren omslag of in een uitwasbare gepersonaliseerde bak);

o mag nooit aan de voorzijde aangeraakt worden;

o moet onmiddellijk verwijderd worden zodra zichtbaar vuil.

Gezien deze uitzonderlijke situatie is de strikte toepassing van de officiële aanbevelingen inzake handhygiëne onontbeerlijk.

- Ontsmet het (medische) materiaal dat in contact komt met de patiënt.
- Wissel handschoenen en schort na het bezoek aan de patiënt en was uw handen met zeep of gebruik een hydro-alcoholische oplossing.
- Was werkkleding dagelijks op 60°C.

NB: Indien de verpleegkundige een asymptomatische huisgenoot is van een mogelijk of bevestigd geval kan hij of zij verder werken, mits het dragen van een chirurgisch masker gedurende 14 dagen voor elk contact met een patiënt. Verder moet extra aandacht besteed worden aan de basis hygiënemaatregelen en onnodige sociale contacten vermeden worden. Gedurende 14 dagen moeten de gezondheidstoestand nauwlettend opgevolgd worden (zelfmonitoring).

4. Wat indien de verpleegkundige zelf symptomen van COVID-19 vertoont?

Een verpleegkundige kan, net als iedereen, de ziekte oplopen. Hij of zij besteedt ten allen tijde bijzondere aandacht aan algemene hygiënische maatregelen en is alert voor het optreden van symptomen van acute luchtweginfectie van de bovenste of onderste luchtwegen.

- Als een verpleegkundige symptomen van een acute infectie van de bovenste of onderste luchtwegen ontwikkelt, neemt hij/zij telefonisch contact op met zijn/haar behandelend arts of de bedrijfsarts.
- Indien de symptomen licht zijn en zonder koorts is verder werken toegelaten, mits het dragen van een chirurgisch masker en extra aandacht voor de algemene hygiënemaatregelen.
- Indien er koorts optreedt moet er een test voor COVID-19 worden uitgevoerd. In afwachting van het testresultaat mag de verpleegkundige niet werken en moet hij/zij in thuisisolatie blijven en de aanbevelingen van de procedure "Hygiënevoorlichting aan de patiënt" volgen.
 - Als het **testresultaat negatief** is, kan de thuisverpleegkundige in overleg met de behandelend arts het werk hervatten.
 - Als het **testresultaat positief** is (bevestigd geval):
 - moet de thuisverpleegkundige **ten minste 7 dagen** in thuisisolatie blijven, of langer, totdat de symptomen verdwijnen;
 - de aanbevelingen van de procedure "Hygiënevoorlichting aan de patiënt" worden verder opgevolgd;
 - er moet telefonisch contact worden opnemen met de behandelend arts of de bedrijfsarts als de symptomen verergeren, of als andere symptomen optreden aan het einde van de arbeidsongeschiktheid. Dit om het verdwijnen van de symptomen te bevestigen en te beslissen over het opheffen van de isolatiemaatregelen.